

Zika Virüsüne Yakından Bakış



Bu görüntü, genetik materyal olarak RNA taşıyan Zika virüsünün bilgisayarda yapılan bir modeli. İlk kez 1947 yılında Uganda'daki Zika Ormanı'nda bir maymun türünde keşfedilen Zika virüsü insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Geçmişte Afrika'nın, Asya'nın ve Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Büyük Okyanus'taki bazı adalarda Zika virüsünün sebep olduğu salgınlara rastlanmıştı. Ancak 2015 yılında Brezilya'da yaşanan salgından sonra bebeklerde görülen mikrosefali (nörogelişimsel bir bozukluk) vakalarındaki artış nedeniyle yapılan araştırmalarda Zika virüsü ile mikrosefali arasında bir ilişki olabileceğine dair bulgular elde edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Şubat ayının başında yapılan açıklamada ise bilimsel olarak kesin kanıtlar elde edilmiş olmamasına rağmen, mikrosefali vakalarının en büyük sorumlusunun hamilelik döneminde geçirilen Zika virüsü enfeksiyonları olduğunun düşünüldüğü belirtiliyor.